

CHEMISEPT G

NAHA ANTISEPTIKUM

CHEMISEPT G on alkoholi baasil värvitu vahend naha preoperatiivseks antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh. tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).



Tootes CHEMISEPT G on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärrituste teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Chemisept G ei ärrita nahka.

Toode on värvitu ja sobib seetõttu kasutamiseks ka kosmeetiliste lõikuste korral.

KASUTAMINE:

Preoperatiivne naha ettevalmistus:

Operatsiooni piirkond töödelda CHEMISEPT G -ga. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutatakse vahendiga ja kantakse nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsiooni piirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit. Intsisioonikile võib kleepida ainult kuivale nahale.

Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava lõike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.

Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.

•Naha injektsiooni ja verevõtmise eelne antiseptika:

Niisutada süstimisriba tootega ning töödelda injektsiooni- või verevõtmise piirkonda, võtta uus süstimisriba ning niisuta nahk teistkordselt, lastes vahendil kuivada. Toimeaeg 30 sekundit.

•Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika:

Niisutada süstimisriba või tampoon ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas, korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga. Toimeaeg naha ettevalmistamiseks 30 sekundit.

MIKROBIOLOOGIA:

Toimeajad on toodud nii väherasuse kui rasuse naha korral.

Mikroorganism	Kontsentratsioon	Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrea	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
HBV	lahjendamata	30 sek
HIV	lahjendamata	30 sek
Adenoviirused	lahjendamata	30 sek
Herpes simplex	lahjendamata	30 sek.
Rota	lahjendamata	30 sek
Vaccina	lahjendamata	30 sek
BVDV	lahjendamata	30 sek
(surrogaarviirus HCV määramiseks)		
Polyomavirus SV40	lahjendamata	5 min

Kuna CHEMISEPT G on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat), vaccinia, Adeno, Rota ja Herpes viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et CHEMISEPT G on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

Toode vastab **EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 12791** nõuetele.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, säde-
metest, leekidest ja muudest süüteallikatest.

Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas



KOOSTIS:

100g toodet sisaldab: etanooli 75 g (toimeaine), kvaternaarsed amooniumühendid -benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides ja C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides 0,1g (toimeaine)

Tootepakend on ümbertöödeldav.

Biotsiidi registreerimistunnistus Nr 0045/05

PAKENDID:



100ml pihustus-
pudel




250ml klappkork/
pihustuspudel



500ml dosaatorpudel
niisutuspumbaga



1000ml dosaatorpudel
korgiga



5000ml kanister